



S

ver 1.0\_11/2024

**Каталог продукции  
Solopharm**

Неврология и психиатрия

 SOLOPHARM

**RX** — рецептурные препараты

**OTC** — безрецептурные препараты

**ЖНВЛП** — жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты

**Компания Solopharm** 4

Инъекционные растворы  
компании Solopharm 6

## Неврология

Артогистан 8

Диагистан 9

Ларигама® 10

Лидамитол / Лидамитол табс 11

Риклинг 12

Флагзамма 13

Элокс Солофарм 14

Итилокт® / Итилокт® БВ 16

Эврин 17

Энцетрон-Солофарм 18

Дэлмигрэн 20

Леветирацетам солофарм 21

## Психиатрия

Цивельт 23

Золтралин солофарм 24

Пароксетин солофарм 25


Таниксен солофарм 26

Атревозол® 27

Мемантин солофарм 28

**Список источников** 30

Портфель включает в себя наиболее востребованные препараты, которые широко используются в медицинской практике и входят в клинические рекомендации по лечению различных неврологических и психических заболеваний



- Препараты SYSADOA
- Комплекс витаминов группы В
- Миорелаксант
- Нестероидные противовоспалительные препараты
- Препараты, обладающие антиоксидантными свойствами
- Ноотропный препарат
- Анксиолитическое средство
- Противомигренозное средство
- Препарат для лечения деменции
- Противозпилептический препарат
- Антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина



## Компания Solopharm



**Solopharm — это команда из более чем 1900 сотрудников, объединенных одной целью: создавать российские лекарственные препараты**

Для этого компания внедряет самые передовые технологии производства и осваивает новые терапевтические направления



**Solopharm — это крупнейшая фармацевтическая компания,** выпускающая лекарственные препараты и медицинские изделия в жидкой и твердой формах выпуска, а также БАДы в капсулах, стик-пакетах и саше-пакетах.

Все производственные площадки Solopharm построены в соответствии со стандартами GMP:

- > **Liquid Plant** — завод по производству жидких лекарственных форм
- > **Solid Plant** — завод по производству твердых лекарственных форм
- > **BioTech** — площадка по разработке и производству биотехнологических продуктов
- > **Food Supplement** — завод по производству БАД

- **Solopharm** присвоен статус системообразующего предприятия фармацевтической промышленности России<sup>1</sup>
- **16-е место** в рейтинге Forbes<sup>2</sup>
- **№1 в назначениях врачей** согласно рейтингу производителей в целевом сегменте рынка<sup>3</sup>
- **География Solopharm** — это 14 стран-импортеров и 85 регионов внутри страны

1. Перечень системообразующих организаций экономики РФ 2020  
 2. Рейтинг Forbes. 20 лучших фармкомпаний РФ – 2021  
 3. По данным IPSOS, 4 кв. 2023, данные по назначениям врачей «Solopharm + конкуренты»

- **ТОП-15** в стоимостном выражении в сегменте e-com<sup>4</sup>
- **ТОП-10** производителей в розничном сегменте<sup>5</sup>
- **3-е место** в рейтинге отечественных производителей<sup>6</sup>
- **№1 в сегменте рынка офтальмологических препаратов** в стоимостном выражении среди всех производителей на российском рынке<sup>7</sup>

4. По данным AlphaRM, Sell Out сегмента e-com, 9м2023  
 5. По данным AlphaRM, янв. 2024, в розничном сегменте (продажи из аптек)  
 6. По данным IPSOS, 4 кв. 2023, по назначениям врачей, производство локализовано в РФ  
 7. По данным IQVIA и DSM Group, 2023, розница (МИ+ЛС)



> В портфеле компании Solopharm более **250 регистрационных удостоверений** и более **250 препаратов** на стадии разработки и регистрации

> **Собственный отдел разработки R&D**, аналитическая и микробиологическая лаборатории обеспечивают фармацевтическую разработку полного цикла: от идеи до внедрения технологии в промышленное производство

> Компания Solopharm располагает своими лабораториями, которые осуществляют контроль качества поступающего сырья на всех стадиях производства, а также готовой продукции

## Инъекционные растворы компании Solopharm

выпускаются в полиэтиленовых ампулах, изготовленных по современной технологии BFS, признанной самой совершенной в мире для производства стерильных лекарственных растворов



**Полиэтиленовые ампулы BFS** (Blow-Fill-Seal — выдув-наполнение-герметизация) — безыгольный забор препарата

### Преимущества ампул BFS (политвист)

- > использование препаратов в полиэтиленовых ампулах BFS удобно и безопасно для пациентов и медицинских работников
- > удобное вскрытие без контаминации за счет эргономичного клапана
- > безыгольный забор препарата в шприц
- > высокая скорость проведения инъекций за счет простоты вскрытия
- > надежная маркировка, нанесенная непосредственно на ампулу



# BFS

**СВР (Colour Break Point — точка излома)** — современная система вскрытия, гарантия легкости, быстроты и безопасности вскрытия стеклянной ампулы

### Преимущества ампул СВР

- > вскрытие в затрудненных условиях без пилки и скарификатора
- > высокая скорость проведения инъекции за счет простоты вскрытия
- > вскрытие при плохом освещении — возможность надлома в любом направлении



## Артогистан

Хондроитин из эталонной субстанции для правильной терапии остеоартрита



**Рекомендован в качестве базисной терапии остеоартрита с первого шага и на всех последующих этапах лечения:**

- уменьшает боль и воспаление
- препятствует разрушению хряща
- улучшает подвижность пораженных суставов
- способствует снижению потребности в нестероидных противовоспалительных препаратах
- выпускается в продуманных формах выпуска для стартовой и курсовой терапии

RX

18+



### Состав

хондроитина сульфат  
100 мг/мл



### Форма выпуска

инъекционные ампулы СВР  
1 мл №10, 2 мл №10, 20

### Лекарственная форма

раствор для внутримышечного введения

### Показания к применению

- > дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: остеоартроз и остеохондроз позвоночника
- > ускорение формирования костной мозоли при переломах

RX

18+

NEW



### Состав

диацереин 50 мг



### Форма выпуска

капсулы в блистере №30

### Лекарственная форма

капсулы

### Показания к применению

- > симптоматическое лечение остеоартроза тазобедренных и коленных суставов при отсутствии необходимости достижения быстрого эффекта

## Диагистан

Уникальный противовоспалительный препарат с симптомно-модифицирующим действием для длительного контроля боли и воспаления при остеоартрите



- оказывает обезболивающее действие, сопоставимое с нестероидными противовоспалительными препаратами<sup>1</sup>
- обеспечивает пролонгированный эффект в течение 2-3 месяцев после окончания терапии<sup>2</sup>
- позитивно влияет на углеводный и липидный обмен, способствует снижению индекса массы тела

# Ларигама®

Нейротропный комплекс  
витаминов группы В



- оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие
- способствует восстановлению нервных волокон
- улучшает проведение нервного импульса
- усиливает действие нестероидных противовоспалительных препаратов

RX

18+



### Состав

пиридоксин, тиамин,  
цианкобаламин, лидокаин



### Форма выпуска

инъекционные ампулы СВР  
2 мл №5, 10

### Лекарственная форма

раствор для внутримышечного  
введения

### Показания к применению

В комплексной терапии:

- > моно- и полинейропатий различного генеза
- > дорсалгии
- > плексопатий
- > люмбоишиалгии
- > корешкового синдрома, вызванного дегенеративными изменениями позвоночника

RX

18+



### Состав

толперизон 100 мг/мл,  
лидокаин 2,5 мг/мл



### Форма выпуска

инъекционные ампулы BFS  
1 мл №5, 10

### Лекарственная форма

раствор для внутримышечного  
введения

RX

18+

NEW



### Состав

толперизон 150 мг



### Форма выпуска

таблетки в блистере №30

### Лекарственная форма

таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

- > симптоматическое лечение спастичности у взрослых, обусловленной инсультом
- > миофасциальный болевой синдром средней и тяжелой степени (в т.ч. мышечный спазм при дорсопатиях)

# Лидамитол / Лидамитол табс


Единственный толперизон в инъекционной форме, который выпускается в ампулах BFS, что соответствует современным стандартам в мировой фармацевтике



- уменьшает мышечный спазм
- усиливает действие нестероидных противовоспалительных препаратов
- не обладает седативным эффектом
- подходит для ступенчатой терапии в связи с наличием как ампульной, так и таблетированной форм

# Риклинг

Нестероидный  
противовоспалительный  
препарат



- обладает двойным механизмом действия (периферический и центральный)
- оказывает быстрый и выраженный обезболивающий эффект
- не повышает риск кровотечений в послеоперационном периоде

RX 18+

- Состав**  
декскетопрофен 25 мг/мл
- Форма выпуска**  
инъекционные ампулы СВР 2 мл №5, 10
- Лекарственная форма**  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения
- Показания к применению**

> симптоматическое лечение острой боли сильной и средней интенсивности (например, при послеоперационной боли, боли в пояснице и почечной колике) при нецелесообразности пероральной терапии

OTC 18+

- Состав**  
декскетопрофен 25 мг
- Форма выпуска**  
таблетки в блистере №10
- Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.
- Показания к применению**

> боли легкой и средней интенсивности (боли в мышцах и костях, при болезненных менструациях, зубной боли)

RX 16+ NEW

- Состав**  
эторикокиб 60, 90, 120 мг
- Форма выпуска**  
таблетки в блистере №7, 14, 28
- Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

- > лечение хронической боли в нижней части спины
- > симптоматическая терапия остеоартрита, ревматоидного артрита, анкилозирующего спондилита, боли и воспаления, связанных с острым подагрическим артритом
- > краткосрочная терапия умеренной острой боли после стоматологических операций

# Флагзамма

Нестероидный  
противовоспалительный  
препарат



- быстрый и сильный обезболивающий эффект, даже после стоматологических операций
- благоприятный профиль безопасности при сопутствующих заболеваниях желудочно-кишечного тракта
- удобный однократный прием в сутки, независимо от приема пищи

# Элокс солофарм

Нестероидный  
противовоспалительный  
препарат



- воздействует на ключевые этапы воспалительного каскада
- обладает благоприятным профилем гастро- и кардиобезопасности
- форма выпуска обеспечивает быстрое, удобное и безопасное вскрытие ампулы



RX

18+



**Состав**  
мелоксикам 10 мг/мл



**Форма выпуска**  
инъекционные ампулы BFS  
1,5 мл №5

**Лекарственная форма**  
раствор для внутримышечного  
введения

## Показания к применению

начальная терапия и краткосрочное симптоматическое лечение при:

- > остеоартрите (артроз, дегенеративные заболевания суставов)
- > ревматоидном артрите
- > анкилозирующем спондилите
- > других воспалительных и дегенеративных заболеваниях костно-мышечной системы, таких как артропатии, дорсопатии (например, ишиас, боль внизу спины, плечевой периартрит и другие), сопровождающихся болью

## Итилокт®/ Итилокт® БВ

Препарат, обладающий антиоксидантными свойствами



- Итилокт® БВ обладает технологией «быстрого высвобождения», что позволяет снизить вариабельность абсорбции<sup>1</sup>
- оказывает антиоксидантное действие<sup>1</sup>
- способствует снижению концентрации глюкозы, а также преодолению инсулинорезистентности<sup>1</sup>
- оказывает гепатопротекторное действие<sup>1</sup>
- снижает содержание липидов и холестерина в крови<sup>1</sup>
- улучшает питание нейронов<sup>1</sup>

RX 18+ ЖНВЛП

- Состав**  
тиоктовая кислота 30 мг/мл
- Форма выпуска**  
инъекционные ампулы СВР 10 мл №10
- Лекарственная форма**  
концентрат для приготовления раствора для инфузий

RX 18+ ЖНВЛП

NEW

- Состав**  
тиоктовая кислота 600 мг
- Форма выпуска**  
таблетки в стеклянном флаконе №30
- Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

- > диабетическая и алкогольная полинейропатия

RX 18+ ЖНВЛП

- Состав**  
этилметилгидроксипиридина сукцинат 50 мг/мл
- Форма выпуска**  
инъекционные ампулы СВР 2 мл №10, 5 мл №5
- Лекарственная форма**  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

RX 18+ SOON

- Состав**  
этилметилгидроксипиридина сукцинат 125, 250 мг
- Форма выпуска**  
таблетки в блистере №30, 40, 50
- Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

- > острые нарушения мозгового кровообращения
- > черепно-мозговая травма, и ее последствия
- > дисциркуляторная энцефалопатия
- > синдром вегетативной дистонии
- > легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза
- > тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях

## Эврин

Препарат, обладающий антиоксидантными свойствами



- улучшает метаболизм и кровоснабжение головного мозга<sup>1</sup>
- активизирует энергетический обмен в клетках<sup>1</sup>
- стимулирует репаративные процессы и ограничивает зону ишемии<sup>1</sup>
- повышает устойчивость организма к воздействию повреждающих факторов<sup>1</sup>

# Энцетрон- солофарм

Ноотропное средство



**Единственный цитиколин для приема внутрь без ароматизаторов в удобных ампулах BFS**

Для максимального раскрытия потенциала мозга:

- > улучшает память
- > повышает концентрацию внимания
- > улучшает работу мозга
- > нормализует эмоциональный фон<sup>1</sup>



RX

18+



**Состав**  
цитиколин 100 мг/мл



**Форма выпуска**  
ампулы BFS 10 мл №10



**Лекарственная форма**  
раствор для приема внутрь

RX

18+

ЖНВЛП



**Состав**  
цитиколин 125, 250 мг/мл



**Форма выпуска**  
инъекционные ампулы BFS 4 мл №5, инъекционные ампулы СВР 4 мл №5




**Лекарственная форма**  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

## Показания к применению

- > когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга
- > острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии)
- > восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов
- > черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и восстановительный период

## Дэлмигрэн

Противомигренозный препарат



**Первый элетриптан российского производства!**

**Элетриптан эффективнее купирует мигренозную боль в первые 2 часа**

- на 42%, чем суматриптан 50 мг<sup>1,2</sup>
- на 45%, чем золмитриптан 2,5 мг<sup>1,2</sup>
- на 7%, чем ризатриптан 10 мг<sup>1,2</sup>

Элетриптан входит в КР МЗ РФ «Мигрень» как наиболее безопасный препарат среди триптанов у пациентов с возможным риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)<sup>3</sup>

RX 18+ NEW



**Состав**  
элетриптан 40 мг



**Форма выпуска**  
таблетки в блистере №2



**Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.



**Показания к применению**

- > для устранения (купирования) приступа мигрени с аурой или без ауры у взрослых от 18 до 65 лет

RX 6+ ЖНВЛП

SOON



**Состав**  
леветирацетам 500, 1000 мг



**Форма выпуска**  
таблетки в блистере №30



**Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.



**Показания к применению**

**в качестве монотерапии при лечении:**


- > парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и подростков с 16 лет с впервые диагностированной эпилепсией

**в составе дополнительной терапии при лечении**

- > парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и детей с 6-ти лет с эпилепсией
- > миоклонических судорог у взрослых и подростков старше 12 лет с ювенильной миоклонической эпилепсией
- > первично-генерализованных судорожных тонико-клонических припадков у взрослых и подростков старше 12 лет с идиопатической генерализованной эпилепсией

## Леветирацетам солофарм

Противоэпилептический препарат




- приводит к улучшению качества жизни пациентов<sup>1</sup>
- обладает наиболее безопасным профилем переносимости среди всех противоэпилептических средств<sup>2</sup>

## Психиатрический портфель компании Solopharm

представлен антидепрессантами из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) для лечения аффективных расстройств (тревоги, депрессии и других)

Портфель включает в себя наиболее востребованные препараты, которые широко используются в медицинской практике и входят в клинические рекомендации по лечению психических расстройств

СИОЗС — препараты первой линии терапии тревоги и депрессии



RX

18+

NEW

### Состав

эсциталопрам 10 мг

### Форма выпуска

таблетки в блистере №30, 60

### Лекарственная форма


таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

- > депрессивные эпизоды любой степени тяжести
- > панические расстройства с/без боязни открытых пространств (агорафобией)
- > социальное тревожное расстройство (социальная фобия)
- > генерализованное тревожное расстройство
- > обсессивно-компульсивное расстройство

## Цивельт

Антидепрессант




**Антидепрессант выбора нового поколения с благоприятным соотношением «эффективность–безопасность» и минимумом лекарственных взаимодействий<sup>1</sup>**

- обеспечивает быструю и эффективную редукцию депрессивной и тревожной симптоматики<sup>2</sup>
- повышает профессиональную, социальную и семейную активность, улучшает качество жизни пациентов<sup>2</sup>
- обладает низким риском лекарственных взаимодействий<sup>2</sup>
- обладает низким риском преждевременной отмены из-за нежелательных явлений<sup>2</sup>

## Золтралин солофарм

Антидепрессант



**Антидепрессант сбалансированного действия для лечения депрессивных расстройств любой структуры у пациентов с соматическими заболеваниями<sup>3</sup>**

- обладает гармоничным анксиолитическим, тимолептическим и стимулирующим эффектами<sup>1,3</sup>
- эффективен в отношении аффективных расстройств любой структуры<sup>1</sup>
- препарат выбора при депрессиях с негативной аффективностью<sup>1</sup>
- не обладает холинолитическим, кардиотоксическим, седативным действием и не влияет на психомоторную активность<sup>2</sup>

RX 6+ ЖНВЛП  
SOON

**Состав**  
сертралин 50, 100 мг

**Форма выпуска**  
таблетки в блистере  
№30

**Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.

**Показания к применению у взрослых с 18 лет**

- > лечение и профилактика больших депрессивных эпизодов
- > панические расстройства с агорафобией и без
- > посттравматическое стрессовое расстройство
- > социальная фобия

**Показания к применению у детей старше 6 лет**

- > обсессивно-компульсивное расстройство

RX 18+ ЖНВЛП  
NEW

**Состав**  
пароксетин 20 мг

**Форма выпуска**  
таблетки в блистере  
№30

**Лекарственная форма**  
таблетки, п.п.о.

**Показания к применению**

- > депрессивные эпизоды средней и тяжелой степени тяжести
- > рекуррентное депрессивное расстройство
- > панические расстройства с/без боязни открытых пространств (агорафобией)
- > социальное тревожное расстройство (социальная фобия)
- > генерализованное тревожное расстройство
- > обсессивно-компульсивное расстройство
- > посттравматическое стрессовое расстройство

## Пароксетин солофарм

Антидепрессант



- обладает быстрым противотревожным действием<sup>1</sup>
- единственный антидепрессант, зарегистрированный при всем спектре тревожных расстройств и депрессии<sup>2</sup>

## Таниксен солофарм

Антидепрессант



**Антидепрессант для терапии пациентов с тревогой и депрессией, сопровождающимися нарушениями сна и когнитивных функций с подтвержденным нейропротективным действием**

- мощный агонист сигма-1-рецепторов с тройным эффектом<sup>1-3</sup>
- оказывает выраженный противотревожный эффект<sup>4</sup>
- способствует улучшению когнитивных функций и нормализации сна<sup>4</sup>
- оказывает минимальное влияние на сексуальную функцию<sup>3</sup>
- эффективен при депрессии тяжелой степени с психотическими симптомами<sup>1,2</sup>

RX

8+

NEW



### Состав

флувоксамин 50, 100 мг



### Форма выпуска

таблетки в блистере  
50 мг №20, 100 мг №30

### Лекарственная форма

таблетки, п.п.о.

### Показания к применению у взрослых

- > депрессии различного генеза
- > обсессивно-компульсивные расстройства

### Показания к применению у детей 8 лет и подростков

- > обсессивно-компульсивные расстройства

OTC

18+

SOON



### Состав

фабомотизол 10 мг



### Форма выпуска

таблетки в блистере  
№60

### Лекарственная форма

таблетки, п.п.о.

### Показания к применению

От 18 лет при тревожных состояниях:

- > генерализованные тревожные расстройства
- > неврастения
- > расстройства адаптации у больных с различными соматическими заболеваниями
- > при дерматологических, онкологических и других заболеваниях
- > при лечении нарушений сна, связанных с тревогой, нейроциркуляторной дистонии, предменструального синдрома, алкогольного абстинентного синдрома, для облегчения синдрома «отмены» при отказе от курения

## Атревозол®

Анксиолитическое средство




### Первый дженерик фабомотизола на российском рынке!

- обладает выраженным противотревожным действием<sup>1</sup>
- не сопровождается явлениями седации, когнитивного дефицита, привыкания и зависимости<sup>1</sup>
- может применяться для длительной терапии<sup>1</sup>
- эффективен при широком спектре тревожных расстройств<sup>1</sup>

# Мемантин солофарм

Средство для лечения  
деменции



- обладает выраженным нейропротекторным эффектом<sup>1</sup>
- оказывает достоверное улучшение когнитивных функций, улучшая общее состояние пациента<sup>2</sup>
- повышает повседневную активность<sup>2</sup>



RX

18+

ЖНВЛП

SOON



### Состав

мемантин 10, 20 мг



### Форма выпуска

таблетки в блистере  
№30, 90

### Лекарственная форма

таблетки, п.п.о.



### Показания к применению

- > деменция средней и тяжелой степени выраженности при болезни Альцгеймера, умеренно-выраженная и умеренно-тяжелая деменция



# Список источников

## Неврология

### Диагистан

1. Алексеева Л.И., Кашеварова Н.Г. Диациреин при лечении остеоартрита. Медицинский совет, 2016, №8.
2. Pavelka K, Bruye`re O, Cooper C, Kanis JA, Burkhard FL, Maheu E, Martel-Pelletier J, Monfort J, Pelletier J-P, Rene R, Reginster J-Y. Diacerein: Benefits, Risks and Place in the Management of Osteoarthritis. An Opinion-Based Report from the ESCEO. *Drugs Aging*, 2016, 33: 75-85. DOI 10.1007/s40266-016-0347-4.
3. Шаралова Е.П., Алексеева Л.И., Лиля А.М. Диациреин в лечении остеоартрита у больных с коморбидностью. Современная ревматология. 2018; 12 (4).

### Итилокт®/ Итилокт® БВ

1. ЛП-№-(005307)-(РГ-РУ) от 25.04.2024.

### Эврин

1. ЛП-№-(002315)-(РГ-РУ) от 10.05.2023.

### Энцетрон-Солофарм

1. Зуева И.Б., Ким Ю.В., Сулова М.Ю. Влияние цитиколина на когнитивные функции у пациентов, перенесших Covid-19. РМЖ, 2021 №5.

### Дэлмигрэн

1. Chris Cameron Triptans in the Acute Treatment of Migraine: A Systematic Review and Network Meta-Analysis *Headache*. 2015 Jul-Aug;55 Suppl 4:221-35. doi: 10.1111/head.12601. Epub 2015 Jul 14.
2. Данные представлены по сравнению количества пациентов (в %), отметивших полное исчезновение мигренозной боли через 2 часа, на продолжении 24, а также количества пациентов (в %), использовавших дополнительные препараты для усиления обезболивающего

эффекта. Результат рассчитан из того насколько % пациентов принимавших элетриптан больше, чем % пациентов, принимавших суматриптан, золмитриптан и ризатриптан. Сравнение проведено для стандартных терапевтических дозировок.

3. КР МЗ РФ Мигрень, 2021.

### Леветирацетам солофарм

1. Карлов В.А., Власов П.Н., Жидкова И.А. Открытое проспективное клиническое исследование эффективности и переносимости препарата леветирацетам в монотерапии фокальной эпилепсии у взрослых при применении референтной и воспроизведенной форм препарата. *Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика*. 2018; (спецвыпуск 1): 12-17.
2. Нежелательные лекарственные реакции противозепилептических средств. Леветирацетам. Муфазалова Н.А. Башкирский государственный медицинский университет, Уфа.

## Психиатрия

### Цивельт

1. С. Г. Бурчинский, ГУ «Институт геронтологии имени Д. Ф. Чеботарева НАМН Украины», Киев, Украина/Депрессии у пациентов пожилого и старческого возраста: проблема выбора препарата антидепрессанта
2. Захарова К.В., Ахапкин Р.В. Место эсциталопрама в лечении депрессивных и тревожных расстройств. РМЖ. 2010;26:1556.

### Золтралин солофарм

1. Канаева Л.С., Ибрагимов Д.Ф., Куликова Т.Ю. Предикторы эффективности применения Стимулотона (сертралина) у больных с непсихотическими депрессивными расстройствами. РМЖ. 2003; 25:1436.
2. Сералин (сертралин) в терапии депрессивных состояний. Ташматов Б.А., Бульчева Н.С., лечащий врач, 2005-12-20.
3. Морозов П.В., Золофт (сертралин) в психиатрии и общей медицинской практике: данные последних лет.

Опубликовано в журнале: «Психиатрия и психофармакотерапия»; том 5; № 3; стр. 3-6. 2012.

4. Аведисова А.С. (д.м.н., проф.) ФГБУ «ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского», отдел терапии психических и поведенческих расстройств «Эффективная фармакотерапия. Эндокринология» №4.

### Пароксетин солофарм

1. Воробьева О.В., Русая В.В. «Тревожные расстройства в общесоматической практике» 2010.
2. На основании инструкций по применению препаратов группы N06A Антидепрессанты, выложенных на ГРЛС.

### Таниксен солофарм

1. Hindmarch I., Hashimoto K. Когнитивные функции депрессия: пересмотренные эффекты флувоксамина, агониста сигма-1-рецепторов // *Hum. PsychopharmacolClin. Exp.* — 2010. — Vol. 25. — P. 193–200.
2. Иванов М.В., Сорокина А.В. Влияние фармакотерапии антидепрессантами на когнитивные функции при депрессивных расстройствах: возможности применения флувоксамина.
3. Serretti A, Chiesa A. Treatment emergent sexual dysfunction related to antidepressants: a meta-analysis. *J Clin Psychopharmacol*. 2009 Jun; 29(3): 259-66.
4. Беккер Р.А., Быков Ю.В. Флувоксамин: антидепрессант широкого спектра с рядом особенностей и преимуществ (обзор литературы). *Психиатрия и психофармакотерапия*, том 21, №1, 2019.

### Атревозол®

1. Драпкина О.М., Федин А.И., Дорофеева О.А., Медведев В.Э., Карева Е.Н., Джигоева О.Н., Куклин С.Г., Соловьева Э.Ю., Абдулганиева Д.И., Ким З.Ф., Григорович М.С., Шапошник И.И., Корягина Н.А., Середенин С.Б. Влияние психосоциальных факторов

риска на течение и прогноз сердечно-сосудистых заболеваний. *Кардиоваскулярная терапия и профилактика*. 2022;21(5):3280. doi:10.15829/1728-8800-2022-3280. EDN JWUMSA.

### Мемантин солофарм

1. Фармакотерапия болезни Альцгеймера, Тихонова О.О., Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, *Materials of conferences, Успехи современного естествознания* №6 2014.
2. Инструкция к мед. применению ЛП-№-(005661) (РУ-РУ) от 10.06.2024



**ООО «ПРОТЕКС»**,

тел.: +7 812 385 47 87  
[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)

**Санкт-Петербург**

Завод: Индустриальный  
пр., д. 71/2, лит. А

Офис: Львовская ул.,  
д. 27, БЦ «Office L27»

**Москва**

Офис: ул. Бутырский  
Вал, д. 10,  
БЦ «Белая площадь»



[solopharm.com](http://solopharm.com)