



**Листок-вкладыш – информация для пациента**  
**Эврин, 125 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
**Эврин, 250 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой**  
Действующее вещество: этилметилгидроксипиридина сукцинат

**Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.**

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.
- Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Эврин и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата Эврин.
3. Применение препарата Эврин.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Эврин.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### 1. Что из себя представляет препарат Эврин и для чего его применяют

Препарат Эврин содержит действующее вещество этилметилгидроксипиридина сукцинат, который относится к группе препаратов, применяемых для лечения заболеваний нервной системы.

### Показания к применению

Препарат Эврин показан к применению у взрослых (старше 18 лет).

Последствия острых нарушений мозгового кровообращения, в том числе после транзиторных ишемических атак, в фазе субкомпенсации в качестве профилактических курсов;

- легкая черепно-мозговая травма, последствия черепно-мозговых травм;
- энцефалопатии различного генеза (дисциркуляторные, дисметаболические, посттравматические, смешанные);
- синдром вегетативной дистонии;
- легкие когнитивные расстройства атеросклеротического генеза;
- тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях;
- ишемическая болезнь сердца в составе комплексной терапии;
- купирование абстинентного синдрома при алкоголизме с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств, постабстинентные расстройства;
- состояния после острой интоксикации антипсихотическими средствами;
- астенические состояния, а также для профилактики развития соматических заболеваний под воздействием экстремальных факторов и нагрузок;
- воздействие экстремальных (стрессорных) факторов.

### Способ действия препарата Эврин

Препарат Эврин обладает антиоксидантным действием (защищает клетки организма от повреждения свободными радикалами), стабилизирует структуры клеточной стенки (мембраны), улучшает кровоснабжение головного мозга, текучесть и вязкость крови, уменьшает содержание общего холестерина. Препарат повышает устойчивость ор-

ганизма к воздействию различных повреждающих факторов при недостаточном поступлении кислорода (гипоксия) или притока крови (ишемия) к органам и тканям, при нарушении мозгового кровообращения, отравлениях алкоголем и антипсихотическими препаратами.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

### 2. О чем следует знать перед применением препарата Эврин

#### Противопоказания:

Не применяйте препарат Эврин:

- если у Вас аллергия на этилметилгидроксипиридина сукцинат или любые другие компоненты данного препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если у Вас острые нарушения функции печени и/или почек.

#### Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Эврин проконсультируйтесь с врачом.

#### Дети и подростки

Не давайте препарат Эврин детям до 18 лет.

#### Другие препараты и препарат Эврин

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки, если Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Этилметилгидроксипиридина сукцинат усиливает действие бензодиазепиновых препаратов, антидепрессантов, анксиолитиков, противосудорожных средств и противопаркинсонических средств, нитратов.

#### Препарат Эврин с алкоголем

Уменьшает токсические эффекты этилового спирта.

#### Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Эврин проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Применение препарата Эврин противопоказано при беременности и в период грудного вскармливания.

#### Управление транспортными средствами и работа с механизмами

В период приема препарата следует соблюдать осторожность при работе, требующей быстроты психофизических реакций (например, управление транспортными средствами, механизмами и т.п.).

### Препарат Эврин содержит натрий

Данный препарат содержит менее 1 ммоль (23 мг) натрия на одну таблетку, то есть, по сути, не содержит натрия.

### Препарат Эврин содержит маннитол

Препарат Эврин содержит маннитол, который может оказывать слабое слабительное действие.

## 3. Применение препарата Эврин

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### Рекомендуемая доза

По 125–250 мг 3 раза в сутки.

Начальная доза – 125–250 мг 1–2 раза в сутки с постепенным повышением до получения терапевтического эффекта. Максимальная разовая доза – 250 мг; максимальная суточная доза – 750 мг.

### Путь и (или) способ введения

Препарат Эврин следует принимать внутрь.

### Продолжительность терапии

Длительность лечения – 2–6 недель; для купирования алкогольной абстиненции – 5–7 дней.

Продолжительность курса терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца не менее 1,5–2 месяцев.

Лечение прекращают постепенно, уменьшая дозу в течение 2–3 дней.

Повторные курсы (по рекомендации врача) желательно проводить в весенне-осенние периоды.

### Если Вы приняли препарата Эврин больше, чем следовало

Передозировка препаратом Эврин маловероятна. В случае передозировки возможны такие симптомы как сонливость, бессонница. Симптомы исчезают самостоятельно в течение суток. При выраженных проявлениях необходимо обратиться к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Эврин, продолжайте применение следующей дозы в обычном режиме. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

## 4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, Эврин может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

**Прекратите принимать препарат Эврин и немедленно обратитесь к врачу**, если у Вас возникла серьезная нежелательная реакция, проявляющаяся быстро развивающимся и нарастающим отеком кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки (ангионевротический отек) (очень редко – может возникать не более чем у 1 человека из 10000).

При применении препарата Эврин нежелательные реакции наблюдались с нижеуказанной частотой:

**Очень редко (могут возникать не более, чем у 1 человека из 10000)**

- крапивница (появление красных волдырей на поверхности кожи);
- сонливость;
- головная боль;
- сухость во рту, тошнота, боль, жжение и дискомфорт в верхней части живота, изжога, ощущение вздутия живота, диарея;
- сыпь, зуд, покраснение кожи.

### Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Вы можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже).

Российская Федерация  
109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, строение 1  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)  
Телефон: +7 800 550 99 03  
Факс: +7 495 698 15 73  
<http://roszdravnadzor.gov.ru>  
e-mail: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

## 5. Хранение препарата Эврин

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на упаковке.

Датой истечения срока годности является последний день месяца.

Хранить в оригинальной упаковке (пачка картонная) при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Содержимое упаковки и прочие сведения

### Препарат Эврин содержит:

Действующим веществом препарата является этилметилгидроксипиридина сукцинат.

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 125 мг, содержит 125 мг этилметилгидроксипиридина сукцината.

Одна таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 250 мг, содержит 250 мг этилметилгидроксипиридина сукцината.

Прочими (вспомогательными) веществами являются: маннитол (E421), микрокристаллическая целлюлоза, кроскармеллоза натрия, повидон К-30, магния стеарат, натрия стеарилфумарат; пленочная оболочка: гипролоза (гидроксипропилцеллюлоза), гипромеллоза 2910 (гидроксипропилметилцеллюлоза), тальк, титана диоксид.

### Внешний вид препарата Эврин и содержимое его упаковки

Круглые, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой от белого до почти белого цвета.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлорида (ПВХ) и фольги алюминиевой печатной лакированной или в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлорид/поливинилденхлорида (ПВХ/ПВДХ) фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 1, 2, 3, 4, 5 или 6 контурных ячейковых упаковок вместе с листком-вкладышем в пачку из картона.

### Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Российская Федерация  
ООО «Гротекс»  
195279, г. Санкт-Петербург,  
Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88  
Адрес электронной почты: [gtrtx@grotexmed.com](mailto:gtrtx@grotexmed.com)  
[www.solopharm.com](http://www.solopharm.com)

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к держателю регистрационного удостоверения:

Российская Федерация  
ООО «Гротекс»  
195279, г. Санкт-Петербург,  
Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А  
Тел.: +7 800 700 04 73  
Адрес электронной почты: [ccc@grotexmed.com](mailto:ccc@grotexmed.com)

### Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации  
Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: <https://eec.eaeunion.org/>.