

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Солосорб

Регистрационный номер: ЛП-007695

Торговое наименование: Солосорб

Международное непатентованное или группировочное наименование: полиметилсилоксана полигидрат

Лекарственная форма: гель для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав

100 г препарата содержат:

Действующее вещество:

Полиметилсилоксана полигидрат 100,0 г

Описание

Влажная масса белого или почти белого цвета, состоящая из желеобразных комочков различного размера, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Энтеросорбирующее средство.

Код АТХ: А07В.

Фармакологические свойства

Препарат имеет пористую структуру кремнийорганической матрицы (молекулярная губка) гидрофобной природы, которая характеризуется сорбционным действием по отношению преимущественно к среднемолекулярным токсическим метаболитам (м.м. от 70 до 1000). Препарат обладает выраженными сорбционным и детоксикационным свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные токсические вещества различной природы, включая бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Препарат сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за

развитие эндогенного токсикоза. Препарат не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов, способствует восстановлению нарушенной микрофлоры кишечника и не влияет на его двигательную функцию.

Фармакокинетика

Препарат не всасывается в желудочно-кишечном тракте, выводится в неизменном виде в течение 12 часов.

Показания к применению

У взрослых и детей в качестве детоксикационного средства:

- острые и хронические интоксикации различного происхождения;
- острые отравления сильнодействующими и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов;
- острые кишечные инфекции любого генеза в составе комплексной терапии (токсикоинфекции, сальмонеллез, дизентерия, диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией, в составе комплексной терапии;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- гипербилирубинемия (вирусные гепатиты) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность);
- с целью профилактики хронических интоксикаций работникам вредных производств (профессиональные интоксикации химическими агентами политропного действия, ксенобиотиками, инкорпорированными радионуклидами, соединениями свинца, ртути, мышьяка, нефтепродуктами, органическими растворителями, окислами азота, углерода, фторидами, солями тяжелых металлов).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата, атония кишечника.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь в виде водной суспензии. Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно растирают в 1/4 стакана воды и принимают внутрь

за 1-2 часа до или после еды или приема других лекарств, запивая водой. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата.

Дозировка для взрослых – 15 г (1 столовая ложка) 3 раза в сутки. Суточная доза – 45 г.

Детям в возрасте от 5 до 14 лет – 10 г (1 десертная ложка) 3 раза в сутки. Суточная доза – 30 г.

Детям в возрасте до 5 лет – 5 г (1 чайная ложка) 3 раза в сутки. Суточная доза – 15 г.

Для профилактики хронических интоксикаций – по 15 г 2 раза в день в течение 7-10 дней ежемесячно. При тяжелых интоксикациях в течение первых трех суток доза препарата может быть увеличена вдвое.

Продолжительность лечения при острых отравлениях – 3-5 суток, а при хронических интоксикациях и аллергических состояниях – 2-3 недели. Повторный курс – по рекомендации врача.

Побочное действие

Возможны тошнота, запор. При тяжелой почечной и/или печеночной недостаточности возможно появление чувства отвращения к препарату.

Передозировка

Случаев передозировки не выявлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Возможно уменьшение всасывания других препаратов при одновременном приеме с препаратом Солосорб.

Особые указания

Препарат может использоваться в комплексной терапии с другими лекарственными средствами при соблюдении правила раздельного во времени приема 1-2 часа до или после приема других лекарственных препаратов.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Влияния препарата на способность управлять транспортными средствами, механизмами не выявлено.

Форма выпуска

Гель для приготовления суспензии для приема внутрь.

По 225 г в тубы из комбинированного материала с защитными мембранами и укупорочными средствами.

По 1 тубе вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

В потребительской упаковке при температуре от 4 °С до 30 °С. Не замораживать.

Предохранять от высыхания после вскрытия упаковки.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, г. Санкт-Петербург,

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

Производитель/Организация, принимающая претензии

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, г. Санкт-Петербург,

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

www.solopharm.com