

# ПИКТОРИД-СОЛОфарм

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Пикторид-СОЛОфарм

### Регистрационный номер:

ЛП-№(000612)-(ПГ-РУ)

### Торговое наименование:

Пикторид-СОЛОфарм

### Международное непатентованное или группировочное наименование:

пиклоксидин

### Лекарственная форма:

капли глазные

### Состав препарата на 1 мл:

#### Действующее вещество:

Пиклоксидина дигидрохлорид 0,500 мг

#### Вспомогательные вещества:

Декстрозы моногидрат 55,000 мг

Полисорбат 80 0,250 мг

Хлористоводородной кислоты до pH 3,5-7,5

раствор 1 М или натрия

гидроксида раствор 1 М

Вода для инъекций до 1 мл

### Описание

Прозрачный бесцветный или слегка окрашенный раствор.

**Фармакотерапевтическая группа:** противомикробное средство.

**Код АТХ:** S01AX16

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Пиклоксидин – производное бигуанидов, противомикробное средство, оказывает антисептическое действие. Активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Eberthella typhosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Shigella dysenteriae*, *Bacillus subtilis*, *Chlamydia trachomatis*, некоторых вирусов и грибов.

#### Фармакокинетика

При местном применении системная абсорбция пиклоксидина низкая.

### Показания к применению

Препарат Пикторид-СОЛОфарм показан взрослым и детям от 0 лет:

- бактериальные инфекции переднего отдела глаза;
- дакриоцистит;
- профилактика инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза.

### Противопоказания

Гиперчувствительность к действующему веществу или к любому из вспомогательных веществ.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

#### Беременность

Применение препарата Пикторид-СОЛОфарм во время беременности не рекомендуется.

#### Лактация

Пикторид-СОЛОфарм не следует применять в период грудного вскармливания.


### Способ применения и дозы

Для лечения бактериальных инфекций закапывают по 1 капле препарата в конъюнктивный мешок 2-6 раз в сутки. Продолжительность лечения составляет 10 дней. Целесообразность и необходимость продления срока лечения свыше 10 дней должна определяться врачом.

В послеоперационном периоде закапывают по 1 капле 3-4 раза в сутки.

Для профилактики послеоперационных осложнений (предоперационная подготовка) закапывают по 1-2 капли препарата в конъюнктивный мешок непосредственно перед хирургическим вмешательством.

#### Порядок работы с флаконом:



1. Вращающими движениями против часовой стрелки открыть флакон и снять колпачок.

2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон, зафиксировать между большим и указательным пальцами одной руки.

3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. Слегка надавить на флакон и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивный мешок глаза.

Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.

4. После использования надеть колпачок на флакон и закрыть вращающими движениями

по часовой стрелке.

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 1 месяца. По истечении этого срока препарат следует выбросить. При видимых повреждениях флакона применять препарат не следует.

#### **Побочное действие**

Возможно развитие аллергических реакций, проявляющихся конъюнктивальной гиперемией.

#### **Передозировка**

Данные о передозировке препаратом отсутствуют.

При попадании в глаза избыточного количества препарата следует промыть глаза стерильным физиологическим раствором.

#### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

При необходимости закапывания нескольких лекарственных средств в конъюнктивальную полость препараты должны применяться по отдельности с интервалом не менее 15 минут.

#### **Особые указания**

Для предотвращения загрязнения раствора препарата при закапывании пациентам следует избегать контакта наконечника открытого флакона с глазом и кожей.

Для предотвращения попадания препарата в системный кровоток через слизистую оболочку носа рекомендуется надавить пальцами на внутренний угол глаза на 2 минуты после закапывания.

В случае использования нескольких местных офтальмологических препаратов перерыв между закапываниями должен составлять не менее 15 минут. Нельзя использовать для субконъюнктивальных инъекций или для введения в переднюю камеру глаза. Глазные капли Пикторид-СОЛОФарм не изменяют цвет контактных линз (включая мягкие гидрофильные), однако при инфекционных заболеваниях ношение контактных линз противопоказано.

#### **Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами**

После закапывания возможно временное затуманивание зрения, которое может повлиять на способность управлять автомобилем или работать с техникой. Если после закапывания проявляются подобные симптомы, пациент должен подождать до восстановления четкости зрения перед тем, как управлять автомобилем или работать с техникой.

#### **Форма выпуска**

Капли глазные 0,05 %.

По 10 мл во флакон с капельницей из полиэтилена низкой плотности и крышкой с контролем первого вскрытия или во флакон-капельницу

из полиэтилена высокого давления в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, или во флакон из полиэтилена низкой плотности в комплекте с пробкой-капельницей и крышкой с контролем первого вскрытия, или во флакон из полиэтилентерефталата с капельницей пластиковой и крышкой с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону из полиэтилентерефталата в пачке из фольгированной пленки или без него.

По 1 флакону из полиэтилена или полиэтилентерефталата или по 1 пакету из фольгированной пленки с флаконом из полиэтилентерефталата вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

#### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

После вскрытия флакона – 1 месяц.

Не применять после окончания срока годности!

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, Санкт-Петербург  
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии**

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, Санкт-Петербург  
Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А  
Тел.: +7 812 385 47 87  
Факс: +7 812 385 47 88  
www.solopharm.com  
www.pictorid.ru