

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

НАТРИЯ ХЛОРИД

Торговое наименование: Натрия хлорид

Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное название: натрия хлорид.

Лекарственная форма: растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций.

Состав

1 л раствора содержит:

Действующее вещество: натрия хлорид – 9,0 г;

Вспомогательное вещество: вода для инъекций – до 1 л.

Описание

Прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: растворитель.

Код АТХ: V07AB

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Раствор натрия хлорида 0,9 % изотоничен плазме крови человека.

Фармакокинетика

Выводится почками.

Показания к применению

Растворение и разведение лекарственных средств.

Противопоказания

Не применять для растворения и разведения лекарственных средств, для которых в качестве обязательного указан другой растворитель.

С осторожностью

Почечная недостаточность, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность (олиго-, анурия).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания определяется инструкцией того препарата, для разведения которого будет применяться раствор натрия хлорида.

Способ применения и дозы

Подкожно, внутримышечно, внутривенно после растворения или разведения лекарственных средств. Приготовление растворов лекарственных средств с использованием натрия хлорида должно производиться в асептических условиях. Количество натрия хлорида с целью приготовления раствора конкретного лекарственного средства определяется инструкцией по применению последнего или в зависимости от ситуации — врачом.

Побочное действие

Редко: ацидоз, гипергидратация, гипокалиемия.

Передозировка

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Натрия хлорид совместим с коллоидными гемодинамичными кровезаменителями. При смешивании с другими лекарственными средствами необходимо визуально контролировать совместимость (тем не менее, возможна невидимая и терапевтическая несовместимость).

Особые указания

Контроль кислотно-основного состояния и электролитов.

Перед растворением лекарственного средства в изотоническом растворе натрия хлорида следует внимательно ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного средства, чтобы избежать несовместимости лекарственного средства и растворителя.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами

Влияние препарата зависит от свойств растворяемого или разводимого раствором натрия хлорида основного препарата.

Форма выпуска

Растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9 %.

По 2, 5 или 10 мл в ампулах из полиэтилена низкой плотности или полипропилена (Политвист) со скручивающимся колпачком для безыгольного забора препарата.

По 5, 10, 20, 50 или 100 ампул вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после окончания срока годности!

Условия отпуска из аптек

Отпускают по рецепту.

Производитель/организация, принимающая претензии

ООО «Гротекс»

Россия, 195279, Санкт-Петербург

Индустриальный пр., д. 71, к. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

www.solopharm.com

