

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эксинта®

Регистрационный номер:

ЛП-№(001539)-(РГ-РУ)

Торговое наименование: Эксинта®**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Аминобензойная кислота

Химическое наименование: 4-аминобензойная кислота**Лекарственная форма:** капли глазные**Состав препарата на 1 мл:***Действующее вещество:*

Аминобензойная кислота 0,07 мг

Вспомогательные вещества:

Натрия хлорид 9,0 мг

Натрия гидроксида раствор 1 М до pH 3,5 – 5,0

Вода для инъекций до 1 мл

Описание

Прозрачный бесцветный или желтоватый, или коричневатый раствор.

Фармакотерапевтическая группа

Противовирусное средство для местного применения.

Код АТХ: S03D**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Аминобензойная кислота является индуктором интерферона, оказывает антиоксидантное, иммуномодулирующее, радиопротекторное действие, ускоряет регенерацию роговицы. Препарат не обладает тератогенным, мутагенным, эмбриотоксическим действием.

Фармакокинетика

При инстилляции в конъюнктивный мешок аминобензойная кислота быстро всасывается и проявляет терапевтическое действие.

Показания к применению

В качестве монотерапии и в составе комплексной терапии вирусных поражений глаза: - конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, кератouveиты, вызываемые вирусом герпеса (*herpes simplex*, *herpes zoster*), аденовирусами; - кератопатии инфекционного, посттравматического и послеоперационного генеза.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к аминобензой-

ной кислоте и вспомогательным веществам.

Применение во время беременности и в период грудного вскармливания**Беременность**

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата во время беременности отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если предполагаемая польза превышает риск.

Лактация

До настоящего времени данные клинических испытаний относительно применения препарата во время лактации отсутствуют. Однако препарат может применяться в том случае, если предполагаемая польза превышает риск.


Способ применения и дозы

Препарат закапывают в конъюнктивный мешок по 1-2 капли 6-8 раз в день.

После клинического выздоровления продолжать инстилляцию по 2 капли 3 раза в день в течение 7 дней.


Дети

Безопасность и эффективность аминобензойной кислоты у детей в возрасте до 18 лет на данный момент не установлены.

Порядок работы с флаконом:

1. Вращающими движениями против часовой стрелки открыть флакон и снять колпачок.
2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон, зафиксировать между большим и указательным пальцами одной руки.
3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз. Слегка надавить на флакон и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивный мешок глаза. Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.
4. После использования надеть колпачок на флакон и закрыть вращающими движениями по часовой стрелке.

Порядок работы с флаконом, укомплектованным упорным устройством:



1. Достать упор и флакон из пачки.
2. Открыть флакон с помощью упора.
3. Закрепить упор на горлышке флакона.
4. Установить упор на веко так, чтобы капельница находилась напротив глазного яблока, закапать необходимое количество препарата.
5. Снять упор с горлышка флакона.
6. Закрепить флакон крышкой.

Порядок работы с флаконом, укомплектованным насадкой-упором для пальцев:



1. Потянув за защитный колпачок вверх, открыть флакон.
2. Осторожно, не касаясь пальцами наконечника флакона, перевернуть флакон и, расположив большой палец одной руки на специальной насадке-упоре, сделать несколько нажатий до появления первой капли.
3. Запрокинуть голову назад, расположить наконечник флакона над глазом и указательным пальцем другой руки оттянуть нижнее веко вниз.
4. Держа большой палец на насадке-упоре, нажать на нее и закапать необходимое количество препарата в конъюнктивальный мешок глаза. Необходимо избегать контактов наконечника открытого флакона с поверхностью глаза и руками.
5. После использования надеть колпачок на флакон.

После вскрытия флакона препарат можно использовать в течение 14 дней. По истечении этого срока препарат следует выбросить. При видимых повреждениях флакона применять препарат не следует.

Побочное действие

В очень редких случаях наблюдаются конъюнктивальная гиперемия, местные аллергические реакции.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные по передозировке препарата отсутствуют.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В комбинации с аналогами нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир и др.), противомикробными средствами (фторхинолоны) и антибиотиками (полимиксин В) усиливается терапевтическое действие этих препаратов.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Не применять препарат одновременно с сульфаниламидными препаратами и их производными (сульфацил натрия).

Применять препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Не отмечено.

Форма выпуска

Капли глазные 0,007 %.

По 5 мл во флакон с капельницей из полиэтилена низкой плотности и крышкой с контролем первого вскрытия или во флакон-капельницу из полиэтилена высокого давления в комплекте с крышкой навинчиваемой и пробкой-капельницей, или во флакон из полиэтилентерефталата с капельницей пластиковой и крышкой с контролем первого вскрытия, или во флакон из коричневого стекла, укупоренный насадкой медицинской с защитным колпачком, укомплектованный насадкой-упором для пальцев или без него.

По 1 флакону из полиэтилена или полиэтилентерефталата в пакете из фольгированной пленки или без него.

По 1 флакону или по 1 пакету из фольгированной пленки с флаконом вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года. После вскрытия флакона – 14 дней.

Не применять после окончания срока годности!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Гротекс»

Российская Федерация, 195279, г. Санкт-Петербург

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Гротекс»

Российская Федерация, 195279, г. Санкт-Петербург

Индустриальный проспект, д. 71, корп. 2, лит. А

Тел.: +7 812 385 47 87

Факс: +7 812 385 47 88

www.solopharm.com